



La clinique du lac d'Aix-les-bains

FICHE TECHNIQUE CHIRURGIE

LA PTOSE MAMMAIRE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- TYPE : remodelage de la peau sur la glande mammaire en supprimant l'excédent de peau
- ANESTHESIE : neuroleptanalgie
- DURÉE DE L'INTERVENTION : 2 heures
- SÉJOUR : ambulatoire ou 24 h
- DÉSOCIALISATION : 5 jours

AVANTAGES : Traite les seins tombants ou bas.

QU'EST LA PTOSE MAMMAIRE ?

La ptose mammaire est définie par un affaissement de la glande et une distension de la peau qui l'enveloppe.

Le sein est en position trop basse et de plus fréquemment « déshabité » dans sa partie supérieure.

La ptose peut exister d'emblée mais survient le plus souvent après un amaigrissement important ou au détour d'une grossesse avec allaitement. Elle peut être isolée et appelée ptose pure, elle peut aussi être associée à un certain degré d'hypertrophie mammaire.

On peut à l'inverse observer une ptose mammaire dans le contexte d'un sein trop petit (hypoplasie ou hypotrophie mammaires).

L'intervention chirurgicale a pour but de remettre l'aréole et le mamelon en bonne position, de re-concentrer, « d'ascensionner » la glande et de retirer la peau excédentaire afin d'obtenir deux seins harmonieux.

Notes personnelles

Contact

Clinique du lac
12 Route de Paris
73100 Brison-Saint-Innocent
Aix-les-bains

Tel : + 33 (0)4 79 52 22 22
Mail : informations@cliniquedulac.com